

Idővel duzzad a prosztatata

CT, röntgen, ultrahang, doktor bácsi mutatóujja, vérvizsgálat (psa), esetleg biopszia (szövetdarabok kicsípése) kellhet a dűlmirigy vizsgálatához. Gyulladás tünetei a gyakori vizelési inger, vizelet pedig alig jön, esetleg alhasi fájdalom vagy az ondó állagváltozásai. Az érett férfiak 80 százalékánál a prosztatata idővel nagyobbodni kezd, később akár a rajta keresztülfutó húgycső összenarításával vizelet pangást okoz, ami miatt állandóan begyullad. Súlyos esetben csak a prosztatata műtéti eltávolítása a megoldás. Tanácsos tudni róla, hogy prosztatata nélkül is van szex, de csak olyan sebésznél, aki a műtéttel nem vágja el, nem is sérti meg az érintett ideget! Felfázástól, fertőzéstől, rendszertelen nemi élettől, stressztől stb. is begyulladhat a prosztatata. Prostatamasszázs üríti a húgycsőbe a gyulladt váladékot, és erős antibiotikumok általában megszüntetik a gyulladást. Gyakori az olyan prostatagyulladás – időskori nagyobbodás nélkül is –, ami véglegesen kikezelhetetlen: nem mulasztható el teljesen, vagy hamar kiújul, sok

A TERMÉSZETGYÓGYÁSZ TANÁCSAI

TÓTH ZSIGMOND
természetgyógyász
minden vasárnap
hasznos információkat
ad olvasóinknak.



Kérdéseiket várjuk

a termeszetgyogysz@borsonline.hu
e-mailre vagy levélben a

Bors, 1149 Bp., Róna u. 120–122. címre.

A borítékra írják rá: „Természetgyógyász”

ezer férfiember életét rémálommá téve. Ők az állandósuló vizelési inger, esetleg fájdalom miatt nem tudnak aludni, dolgozni, de egy filmet végignézni sem évek-évtizedek óta, házasságuk is tönkremehet. Csak spéci, személyre szabott, a medencei nyirokkeringést beindítani képes gyógynövénykúrákkal lehet visszavezetni őket újra a normális életbe, ezért nincs értelme felsorolni a leghatásosabb növényeket. Folyamatos virágpör-, speciális magolaj- és teakúrától nagyobbodás sem lesz.